

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

**Resiliencia en pacientes con enfermedad renal crónica
en tratamiento de hemodiálisis en un centro de diálisis
2017**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Nefrología

AUTOR

Luisa BENITES REVOLLEDO

ASESOR

Teresa Catalina SURCA ROJAS

Lima - Perú

2018

RESUMEN

AUTOR : LUISA BENITES REVOLLEDO

ASESOR : TERESA CATALINA SURCA ROJAS

El **objetivo** fue determinar la resiliencia en pacientes con enfermedad renal en tratamiento de hemodiálisis en un Centro de Diálisis 2017. **Material y Método.** El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra fue obtenida por muestreo de proporciones para población finita conformada por 42. La técnica fue la entrevista y el instrumento la escala de resiliencia de Wagnild y Young, aplicado previo consentimiento informado. **Resultados.** Del 100% (42), 67% (27) es alta y 36% (15) baja. En la dimensión de aceptación de uno mismo y de la vida, 59% (25) es alta y 41% (17) baja; y en la dimensión competencia personal 62% (26) es alta y 38% (16) baja. Los ítems en la dimensión aceptación en sí mismo y de la vida es alto ya que 76% (32) expresan que por lo general encuentra algo de que reírse, 74% (31) rara vez pregunta la finalidad de todo; en la dimensión competencia personal, 71% (30) puede ver la situación de varias maneras y 50% (21) están decididos; mientras que los ítems de baja resiliencia en la dimensión aceptación en sí mismo y de la vida, 38% (16) no aceptan que hallan personas a las que no le agrada, 55% (23) pueden estar solos si lo tiene que hacer y 69% (29) sienten que no pueden manejar varias cosas al mismo tiempo. **Conclusiones.** La mayoría de pacientes tienen resiliencia alta, ya que encuentran algo de que reírse, rara vez pregunta la finalidad de todo, puede ver la situación de varias maneras, están decididos, y tienen autodisciplina; seguido de un porcentaje menor bajo, ya que pueden estar solos si lo tiene que hacer y no pueden manejar varias cosas al mismo tiempo con tranquilidad.

PALABRAS CLAVES: Resiliencia, Enfermedad Renal Crónica, Tratamiento de Hemodiálisis.

SUMMARY

AUTOR : LUISA BENITES REVOLLEDO

ASESOR : TERESA CATALINA SURCA ROJAS

The objective was to determine the resilience in patients with kidney disease in hemodialysis treatment in a Dialysis Center 2017. Material and Method. The study was of application level, quantitative type, descriptive method of cross section. The sample was obtained by sampling proportions for a finite population consisting of 42. The technique was the interview and the instrument the scale of resilience of Wagnild and Young, applied prior informed consent. Results Of 100% (42), 67% (27) is high and 36% (15) low. In the dimension of acceptance of oneself and of life, 59% (25) is high and 41% (17) low; and in the personal competence dimension 62% (26) is high and 38% (16) low. The items in the self-acceptance and life dimension are high since 76% (32) express that they usually find something to laugh about, 74% (31) rarely ask the purpose of everything; in the personal competence dimension, 71% (30) can see the situation in several ways and 50% (21) are determined; while the items of low resilience in the dimension acceptance in itself and of life, 38% (16) do not accept that they find people who do not like it, 55% (23) can be alone if they have to do it and 69% (29) feel that they can not handle several things at the same time. Conclusions Most patients have high resilience, since they find something to laugh about, they rarely ask the purpose of everything, they can see the situation in various ways, they are determined, and they have self-discipline; followed by a lower low percentage, since you can be alone if you have to do it and can not handle several things at the same time with peace of mind.

KEY WORDS: Resilience, Chronic Kidney Disease, Hemodialysis Treatment.